

# Verstopfung?

Die schnelle Hilfe ohne Nebenwirkungen und ohne Gewöhnung:

## Lecicarbon® CO<sub>2</sub>-Laxans

Nach dem Vorbild der Natur



- Sicherer Wirkungseintritt nach 15-30 Minuten
- Einfache Anwendung – Sauberes Ergebnis
- Natürliches Wirkprinzip
- Ohne Nebenwirkungen
- Keine Gewöhnung

Bitte senden Sie mir kostenlose **Ärzt muster** gemäß § 47 AMG zu für

**Lecicarbon® E** CO<sub>2</sub>-Laxans (Zäpfchen für Erwachsene)

Name (in Blockbuchstaben):

Praxis-/Firmenstempel:

Datum und Unterschrift:

Bitte zurück an Fax: 06452 92 942-15

### Lecicarbon® E CO<sub>2</sub>-Laxans für Erwachsene

**Zusammensetzung:** Arzneilich wirksame Bestandteile: Natriumhydrogencarbonat 500 mg, Natriumdihydrogenphosphat 680 mg. Sonstige Bestandteile: Hartfett, (3-sn-Phosphatidyl)cholin (aus Sojabohnen), hochdisperses Siliciumdioxid.

**Darreichungsform und Packungsgrößen:** Suppositorien zur rektalen Anwendung. Originalpackung mit 10, 30 oder 100 Zäpfchen; Klinikpackung mit 50 x 10 Zäpfchen.

**Anwendungsgebiete:** Zur kurzfristigen Anwendung bei verschiedenen Ursachen der Stuhlverstopfung z. B. bei schlackenarmer Kost oder mangelnder Bewegung sowie bei Erkrankungen, die eine erleichterte Stuhlentleerung erfordern. Zur Darmentleerung bei diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen im Enddarmbereich. Lecicarbon® kann auch zusätzlich angewendet werden, wenn vorher andere Abführmittel erfolglos genommen wurden.

**Gegenanzeigen:** Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei Darmverschluss (Ileus) und bei Megakolon (krankhafte Enddarterweiterungen aus unterschiedlichen Ursachen); insbesondere bei Kindern und Säuglingen für alle Erkrankungen im Anal- und Rektalbereich, bei denen die Gefahr des übermäßigen Übertritts von Kohlendioxid in die Blutbahn besteht; bei Überempfindlichkeit gegenüber Soja, Erdnuss oder einem der sonstigen Bestandteile von Lecicarbon® E CO<sub>2</sub>-Laxans.

**Nebenwirkungen:** (3-sn-Phosphatidyl)cholin (Sojalecithin) kann sehr selten allergische Reaktionen hervorrufen. *Hinweis:* In seltenen Fällen kann das Einführen des Zäpfchens ein leichtes, schnell abklingendes Brennen verursachen. Sollten bei der Anwendung Nebenwirkungen auftreten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Dosierungsanleitung:** Soweit nicht anders verordnet, bei Bedarf ein Zäpfchen einführen; gegebenenfalls kann die Anwendung nach ca. 30 Minuten bis 1 Stunde wiederholt werden. Es stehen Zäpfchen in der Dosierung für Erwachsene, Kinder und Säuglinge zur Verfügung. Zu beachten ist die jeweilige Zäpfchenart. Lecicarbon® E CO<sub>2</sub>-Laxans darf über längere Zeit angewendet werden und führt nicht zur Gewöhnung. Bei chronischer Verstopfung sollte jedoch in jedem Fall der Arzt zu Rate gezogen werden.

**Art der Anwendung:** Zäpfchen an der Perforation vom Streifen abtrennen und Laschen mit beiden Händen anfassen und auseinanderziehen! Zäpfchen in den After einführen. Ein kurzes vorheriges Eintauchen in Wasser erleichtert das Einführen. Bei Kindern eventuell beide Gesäßhälften zusammendrücken, um ein sofortiges Herauspressen des Zäpfchens zu vermeiden. Der Wirkungseintritt erfolgt nach 15 bis 30 Minuten.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

athenstaedt D-35088 Battenberg (Eder) · CH-Brunnen

[www.lecicarbon.de](http://www.lecicarbon.de)